PARACELSO

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

ALCOHOL YODADO

DCI: Yodo (Iodine) y Yoduro de potasio (Potassium iodide)

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

Composición

Cada 100 mL contiene:

- Yodo metálico ..... 0.1 g
- Yoduro de potasio ..... 0.01 g
- Alcohol etílico 96° ..... 70 g
- Agua purificada c.s.p. ..... 100 mL

Forma farmacéutica: Solución. Vía de administración: Tópica. Grupo farmacoterapéutico: antiséptico desinfectante.

Fabricado por Laboratorios Paracelso Cía. Ltda. Dirección: Km 6 vía a Racar, frente a la Mutualista Azuay 2.

SOLUCIÓN TÓPICA, USO EXTERNO — PRODUCTO DE VENTA LIBRE

Indicaciones

El Alcohol Yodado se utiliza comúnmente para desinfectar la piel antes de realizar procedimientos médicos o intervenciones quirúrgicas. También se puede usar para desinfectar heridas menores, cortaduras o abrasiones.

Es un antiséptico cutáneo de amplio espectro, eficaz contra bacterias, hongos, levaduras y protozoos.

Posología y forma de administración

Se administrará de forma tópica. Dado que el producto es de administración tópica, no influye si se usa antes o después de la ingesta de alimentos.

Posología: aplicar directamente sobre piel seca y limpia, de dos a tres veces al día.

Limitaciones de uso y tiempo

- Uso corto y puntual.
- No utilizar de forma continua por períodos prolongados.
- Aplicación por máximo 5 a 7 días consecutivos, salvo indicación médica.
- De 1 a 3 veces al día, según necesidad.
- Evitar aplicaciones excesivas.

Limitaciones de uso

- No aplicar en áreas extensas ni en grandes superficies de piel.
- No usar en heridas profundas o graves.
- No usar como tratamiento principal, ya que es un producto de desinfección superficial. Evitar el uso continuo por más de una semana.
- No aplicar en mucosas (oral, nasal, genital).

Interrumpir inmediatamente si aparece:

- Irritación intensa.
- Enrojecimiento persistente.
- Reacción alérgica.

Qué hacer en caso de omisión de una dosis o aplicación

Si se omite una aplicación, aplicar tan pronto como se recuerde. Si está próximo el momento de la siguiente aplicación, omitir la dosis olvidada y continuar con el esquema habitual. No duplicar la aplicación para compensar la dosis omitida. Evitar el uso excesivo para prevenir irritación.

Contraindicaciones

No debe usarse por tiempo prolongado, ni de forma regular durante el embarazo y la lactancia. Su uso en obstetricia está desaconsejado.

En la antisepsia, no se deben utilizar apósitos oclusivos.

Puede afectar a la glándula tiroides y a las pruebas de la función tiroidea.

Está contraindicado en recién nacidos y en personas alérgicas al yodo.

Precauciones

Solo para uso externo. Evite el contacto con los ojos, mucosas y oídos. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua.

No debe usarse por tiempo prolongado, ni se deben aplicar vendajes que impidan la aireación de la zona.

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Es una fórmula para uso externo.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No aplicar de forma concomitante con mercurio, plata, peróxido de hidrógeno y taurolidina. Evitar el uso prolongado con litio.

No tiene interacción con la ingesta de alcohol o tabaco, ya que el producto es de uso tópico.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Debe evitarse el uso de Alcohol Yodado en mujeres embarazadas, ya que el yodo absorbido puede atravesar la barrera placentaria, lo que podría producir hipotiroidismo en el feto.

Debe evitarse un uso continuado de Alcohol Yodado durante la lactancia, ya que el yodo absorbido puede excretarse a través de la leche materna, lo que podría producir hipotiroidismo en el lactante.

Uso en niños

Úsese con precaución en áreas extensas de la piel, con piel lesionada o quemada.

Uso en pacientes geriátricos

Estar alerta a signos de irritación, como enrojecimiento o reacciones cutáneas.

Uso concomitante con otras patologías

Usar con precaución en pacientes con trastornos tiroideos o insuficiencia renal, ya que un uso prolongado puede generar alteraciones.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No existe ningún indicio de que la administración de yodo metálico, yoduro de potasio y alcohol etílico 70%, utilizados de manera tópica, pueda afectar la capacidad de conducir o utilizar máquinas.

Reacciones adversas

Cuando se aplica en grandes zonas y durante tiempo prolongado, debido a la absorción del yodo, puede producir trastornos tiroideos y reacciones alérgicas con urticaria, angioedema, hemorragia cutánea, fiebre, artralgia, linfoadenopatía y eosinofilia.

Es irritante para los ojos y las mucosas.

Sobredosis

Efectos gastrointestinales: la ingestión de Alcohol Yodado puede provocar síntomas gastrointestinales graves, como dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

Daño renal: la presencia de yodo en el cuerpo en cantidades excesivas puede afectar negativamente a los riñones, causando daño renal.

Efectos en la tiroides: el yodo es esencial para el funcionamiento normal de la glándula tiroides, pero en exceso puede alterar dicho funcionamiento, llevando a problemas como el hipertiroidismo.

Interacciones medicamentosas

Puede afectar a la glándula tiroides y a las pruebas de la función tiroidea.

Efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los padecen.

Durante el periodo de utilización del Alcohol Yodado se han observado los siguientes efectos adversos, cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: raramente, trastornos de la piel, como irritación local, picor o escozor. En estos casos, se debe suspender el tratamiento y lavar la zona afectada con agua.

Podrían producirse reacciones alérgicas con síntomas como hinchazón de la piel y tejidos bajo ella (angioedema), dolor articular, sangrado en la piel, aumento importante del número de eosinófilos (un tipo de glóbulos blancos), fiebre, agrandamiento de ganglios linfáticos (linfadenopatías), y un trastorno que produce exceso de hematomas y sangrado.

Condiciones de almacenamiento

Consérvese a una temperatura no mayor a 30 °C. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

El producto debe ser utilizado antes de su fecha de caducidad, la cual se encuentra impresa en el envase.

Presentaciones comerciales

- Envases de 100 mL, 120 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, 3750 mL y 3850 mL.
- Envases de 100 mL, 120 mL, 250 mL, 500 mL y 1000 mL, con atomizador.

Reg. San: GN-468-06-11