PARACELSO

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

GUAYACOL POMADA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

1. Forma farmacéutica

Pomada.

2. Vía de administración

Uso cutáneo. Este medicamento debe aplicarse sobre la piel.

3. Composición (100 g)

- Salicilato de metilo ..... 1,0 g
- Mentol ..... 2 g
- CI 18965 ..... 0,1 g
- Vaselina c.s.p. ..... 100,0 g

4. Actividad e indicaciones

Rubefaciente, analgésica y antiinflamatoria. Tratamiento sintomático de los dolores musculares y articulares.

5. Contenido

Guayacol pomada es de uso tópico. Véase en la etiqueta del producto el contenido neto declarado por el fabricante. Laboratorios Paracelso comercializa presentaciones de 12 gramos y un kilo.

6. Contraindicaciones

Está contraindicada en caso de alergia a salicilatos o antiinflamatorios no esteroideos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Evitar tratamientos prolongados.

7. Precauciones

No aplicar sobre ojos, mucosas ni piel herida o quemada. «Manténgase fuera del alcance de los niños».

8. Interacciones

Hasta el momento no se han descrito las posibles interacciones de este medicamento.

9. Advertencias

Uso en niños: utilizar con precaución en niños menores de 7 años.

10. Posología

Aplicar según el criterio del especialista.

11. Normas para la correcta administración

Depositar en el área dolorida una cantidad de pomada proporcional a la zona afectada y extenderla uniformemente. Lavar las manos después de cada aplicación.

12. Intoxicación y sobredosis

Muy raros casos. En caso de intoxicación o sobredosis, el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico.

13. Reacciones adversas

Eritema y escozor en el lugar de aplicación.

14. Conservación

«Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños». Conservar protegido de la luz y del calor, a una temperatura no mayor a 30 °C.

15. Caducidad

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicada en el envase.

16. Nombre y dirección del fabricante

Guayacol pomada es fabricada y distribuida por Laboratorios Paracelso Cía. Ltda. Km 6 camino a Racar, frente a la Mutualista Azuay 2.

Reg. San: 957-MEN-0916