PARACELSO

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

JABÓN DE CLORHEXIDINA 4%

Solución Tópica

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, o farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

1. Qué es JABÓN DE CLORHEXIDINA 4% y para qué se utiliza

El JABÓN DE CLORHEXIDINA 4% es un jabón líquido que posee acción desinfectante con amplio espectro microbicida contra virus, bacterias y hongos. Es de uso tópico sobre la piel.

2. Composición del jabón de clorhexidina 4%

Cada 100 mL del producto contiene:

- Gluconato de clorhexidina al 20% 4%
- Excipientes: cocobetaína, comperlan, glicerina, colorante rojo, fragancia, agua purificada c.s.p. 100%

3. Forma farmacéutica y contenido

El jabón de clorhexidina 4% es una solución tópica. Presentaciones de 100 mL, 120 mL, 250 mL, 500 mL, litro y 3.85 litros con tapa más inserto.

También está disponible en presentaciones de 100 mL, 120 mL, 250 mL y 500 mL con dispensador más inserto.

4. Indicaciones terapéuticas

El gluconato de clorhexidina es un agente antimicrobiano tópico que se utiliza en la preparación de la piel del paciente antes de una operación quirúrgica y en el lavado de heridas. El espectro antibacteriano de la clorhexidina incluye tanto a bacterias Gram-positivas como Gram-negativas, algunos virus como el HIV y algunos hongos, pero solo es esporicida a elevadas temperaturas.

La actividad antiséptica de la clorhexidina es superior a la de la povidona, la espuma de alcohol y el hexaclorofeno. La clorhexidina es un antiséptico tópico ideal, con un efecto muy rápido y una mínima absorción, aunque se han asociado algunas reacciones alérgicas al tratamiento tópico con clorhexidina.

5. Indicaciones necesarias antes de usar el producto

No usar jabón de clorhexidina 4% si es alérgico (hipersensible) al gluconato de clorhexidina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

6. Modo de uso

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o enfermero. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico. Este medicamento debe administrarse directamente sobre la piel y luego enjuagar.

Humedezca los brazos y antebrazos con agua limpia, coloque de 5 a 10 mL de jabón de clorhexidina 4%, frote brazos, antebrazos, espacios interdigitales y uñas, y enjuague con abundante agua.

7. Posibles efectos adversos, contraindicaciones e interacciones

Interacciones e interferencias

No se conocen. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Evitar tratamientos prolongados.

Advertencias

Evitar el contacto cerca de los ojos o de zonas sensibles (membranas mucosas), ya que puede provocar irritación. En caso de contacto con los ojos o las mucosas de las vías de entrada en el cuerpo, se debe lavar inmediatamente el área afectada con abundante agua.

Evitar el contacto sobre la parte interna de la oreja (oído medio) y el contacto directo con el tejido neural (por ejemplo, el cerebro y la médula espinal). Utilice con cuidado en neonatos, especialmente en prematuros. Puede causar quemaduras químicas en la piel.

Puede, en raras ocasiones, causar reacciones alérgicas graves llevando a una disminución en la presión arterial e incluso inconsciencia. Los primeros síntomas de una reacción alérgica grave pueden ser erupción cutánea o asma. Si nota estos síntomas, deje de usar el producto y contacte con su médico lo antes posible.

El producto debe aplicarse suavemente sobre la piel. Si la solución se aplica de forma demasiado vigorosa sobre piel frágil o sensible, o tras un uso repetido, puede producirse eritema, inflamación, picor, piel seca y/o descamada, y dolor. Ante el primer signo de cualquiera de estas reacciones, debe suspenderse la aplicación. Evite el contacto prolongado con la piel.

8. Efectos indeseables

Se puede presentar hipersensibilidad al componente, escozor y picor de duración breve después de la aplicación por vía tópica.

9. Conservación del producto

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que aparece en el envase (después de VEN.).

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente. No ingerir. Producto de venta libre.

10. Nombre y dirección del fabricante

Es fabricado y distribuido por Laboratorios Paracelso Cía. Ltda. Km 6 camino a Racar, frente a la Mutualista Azuay 2.

Reg. San: 3122-MEN-0421