PARACELSO

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

POMADA SUIZA

Guayacol

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

1. Forma farmacéutica

Pomada.

2. Vía de administración

Uso cutáneo. Este medicamento debe aplicarse sobre la piel.

3. Composición (100 g)

- Salicilato de metilo ..... 3,0 g
- Guayacol ..... 1 g
- CI 40800 ..... 0,2 g
- Vaselina c.s.p. ..... 100,0 g

4. Actividad e indicaciones

Rubefaciente, analgésica y antiinflamatoria. Tratamiento sintomático de los dolores musculares y articulares.

5. Contenido

Pomada Suiza es de uso tópico. Véase en la etiqueta del producto el contenido neto declarado por el fabricante. Laboratorios Paracelso comercializa presentaciones de 12 g y 60 g.

6. Contraindicaciones

Está contraindicada en caso de alergia a salicilatos o antiinflamatorios no esteroideos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Evitar tratamientos prolongados.

7. Precauciones

No aplicar sobre ojos, mucosas ni piel herida o quemada. «Manténgase fuera del alcance de los niños».

8. Interacciones

Hasta el momento no se han descrito las posibles interacciones de este medicamento.

9. Advertencias

Uso en pediatría

No recomendado en menores de 2 años. Para niños de 2 a 12 años, usar con precaución y por tiempo limitado. Para mayores de 12 años, seguir las instrucciones del producto.

Embarazo y lactancia

Usar con precaución, evitando aplicaciones extensas o prolongadas.

Adultos mayores

Uso localizado y por tiempo limitado.

Precaución para conducir vehículos y operar maquinaria

Ninguna, dado que el producto es de uso externo.

10. Posología

Aplicar de dos a tres veces al día.

Normas para la correcta administración

Colocar en el área dolorida una cantidad de pomada suficiente para la zona afectada y extenderla uniformemente. Lavar las manos después de cada aplicación.

11. Intoxicación y sobredosis

Muy raros casos. En caso de intoxicación o sobredosis, el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico.

12. Reacciones adversas

Eritema y escozor en el lugar de aplicación.

13. Conservación

«Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños». Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C.

Caducidad

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicada en el envase.

14. Nombre y dirección del fabricante

Pomada Suiza es fabricada y distribuida por Laboratorios Paracelso Cía. Ltda. Km 6 camino a Racar, frente a la Mutualista Azuay. Presentaciones de 12 g y 60 g.